

預防登革熱， 方法報你知

登革熱噴藥注意事項



資料來源：
台南市政府
衛生福利部疾病管制署
楊為傑醫師 / 沈靜芬醫師 / 黃菁樺醫師



預防登革熱

落實居家整潔



經常巡檢



清除積水



刷洗容器



容器減量

使用防蚊液

- 含DEET(待乙妥)
- 衛福部核準產品



裝設紗門窗





認識登革熱

病原體



登革病毒

Dengue virus (黃熱病毒科/屬)

分為I、II、III、IV四種
型別，在臺灣皆流行過

傳染途徑



藉帶病毒病媒蚊叮咬
而感染，不會人傳人

病媒



埃及斑蚊(室內)
兩條彎曲白線
嘉義以南各縣市



白線斑蚊(戶外)
一條白色縱紋
全島皆有分布

..... 白天活動




一隻帶原蚊最
多可以**傳染**給



16人

登革熱會有什麼症狀？


登革熱症狀，有發燒、眼窩痛、噁心想吐、肌肉痛、骨頭痛或出疹等々等々。



我該何時去檢查？

登革熱從發病開始第一二天去檢查，會有比較高的機會驗不出來。而且前一兩天會變嚴重的機會並不大。所以建議先到本校家醫科或一般診所就診，做登革熱快篩檢查，最需要檢查的時間點並不是發病後第一二天，而是第三天起最需要密切注意。

本校家醫科備有登革熱快篩劑，看診時間：星期一~星期五 上午 8:30~12:00



若有症狀，請減少活動史，
可減少登革熱噴藥地點




登革熱NS1快篩

本校家醫科
有提供


NS1快篩優點

及早診斷
快速防疫



適用條件

不明原因發燒
有疑似症狀



提供地點

各衛生所
相關醫療院所





登革熱的處置

在家休養

- 至少一週
- 遵醫囑、多休息、多喝水



無特效藥物



做好防蚊措施

- 使用蚊帳、防蚊液、著長袖衣褲



無疫苗使用



不要趴趴走

- 居家隔離至少一週
- 避免散布



得病勿恐慌，妥善治療會在1~2週後恢復！



登革熱通報

有發燒，眼窩痛，噁心、肌肉痛、骨頭痛或出疹時請不上課，在家休息，並上體溫自主回報系統通知 諮商與健康促進組，以利追蹤健康狀況。

體溫自主回報系統 學務處 諮健組首頁，網址：
<https://urgent-osa.nsysu.edu.tw/login>

或QR code



通知系所或校
安中心也可以
喔~校安專
線:07- 5252
000轉6666

登革熱很恐怖，那我該怎麼辦？

減少病媒蚊：

- 1.蚊子必須把卵產在積水中以產生後代。所以只要把積水儘可能的去除掉，便可以減少病媒蚊的繁殖。
- 2.寢室/租屋處的花盆，水槽，任何會積水的地方，都可能有蚊子，所以應盡量清除。不使用的容器，應收起來或把它倒過來放，避免積水。
- 3.配合噴藥，減少蚊子。

預防被叮咬：

- 1.穿著淺色長袖衣物，並且使用「有效」的防蚊液。有效的防蚊液必須含有 DEET（敵避，或稱待乙妥）。
- 2.DEET 的防蚊液，要選擇衛福部認證的，孕婦與孩童皆可使用（疾管署有公告），但是濃度最好低於 30 %。
- 3.遠離病媒蚊熱點(警戒區)，如果一定要去請做好防蚊措施



化學防治作為

噴藥目的

- 藉由環保署核准用藥殺死帶病毒病媒蚊防止疫情擴散



噴藥原則

- 確診病例週圍50公尺
戶內外皆要執行，視疫情及現場狀況調整噴藥範圍



注意事項

噴藥前

- 門窗緊閉
- 食物收妥
- 寵物帶開
- 走道淨空
- 不用養生膠帶



噴藥後

- 戶內密閉1小時
- 通風半小時再進入
- 注意地板濕滑
- 身體不適儘速就醫



請民眾務必配合各項防疫措施

查獲子叉

傳染病防治法第25條



新臺幣3千~1萬5千元罰鍰

拒絕配合

傳染病防治法第36條



新臺幣3千~1萬5千元罰鍰

拒絕噴藥

傳染病防治法第38條



新臺幣6~30萬元罰鍰

登革熱噴藥前注意事項

- 《噴藥前注意事項》
- 噴藥前請先將室內、外可能成為病媒蚊孳生源之積水容器徹底清除。
- 重要物品請收拾或蓋好，食物一定要覆蓋。
- 人或寵物應到屋外並將門窗緊閉，不可待在室內，室內房間的門請勿上鎖以利噴藥工作進行。

- 《噴藥後注意事項》
- 噴完30-60分鐘後戴口罩入內打開門窗，充分通風30分鐘後再進入屋內。
- 進入屋內請注意地板濕滑，小心行走。
- 較常接觸或使用的物品，使用溼布或地板清潔劑擦拭即可。
- 罹患氣喘、過敏、氣道敏感者，請戴口罩，並室內完全通風後再行進入。
- 若因特別體質出現不適症狀，請盡速就醫。